



# FIORENTEX VP®

## POTENCIALIZADOR DE FLORACIÓN

Estimulante de alta especialidad y concentración, diseñado para activar los procesos metabólicos en los puntos de crecimiento. Favorece una floración uniforme y homogénea, y estimula el cuajado inicial del fruto de manera eficiente.



### Composición garantizada % p/p

#### BIOESTIMULANTES VP

L - CISTEÍNA	5.00
ALGAS MARINAS ( <i>Ascophyllum nodosum</i> )	5.00
CALCIO	6.00
BORO (B)	3.00
ZINC (Zn)	3.00
ÁCIDO FÓLICO	10,000 ppm
VITAMINAS	10,000 ppm
COBALTO (Co)	2,400 ppm
EXTRACTOS ORGÁNICOS	70.76

Presentación: 500 g y 5 kg



REV OCT24



## Descripción del producto

**FIORENTEX VP®** es un estimulante con un alto grado de especialidad, altamente concentrado, que tiene como hormona protagonista al ácido betanafoxiácetico, una auxina sintética capaz de generar activación metabólica en los puntos de crecimiento, y en combinación con el ácido fólico, elementos minerales y orgánicos, nos ayudan a promover una floración uniforme y homogénea, además de prevenir la caída precoz de flores y frutos.

**FIORENTEX VP®** favorece el transporte de azúcares a través de las membranas celulares y provee micronutrientes y vitaminas necesarias para la floración y fructificación.

### Beneficios del uso de **FIORENTEX VP®**

- Promueve la homogeneización de yemas florales.
- Favorece el cuajado de frutos.
- Reduce aborto de frutos.
- Facilita asimilación de microelementos.
- Atrae polinizadores naturales.
- Favorece el transporte de azúcares y vitaminas.

## Recomendaciones de uso

**FIORENTEX VP®** se recomienda aplicar vía foliar; sus efectos son especialmente notables después de la diferenciación floral, favoreciendo una floración uniforme.

**FIORENTEX VP®** se recomienda aplicar de una a dos veces durante la etapa fenológica recomendada.

CULTIVOS	DOSIS/ha	ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate de cáscara	FOLIAR 100 - 200 g	Aplicar a inicios de floración y realizar aplicaciones subsecuentes con intervalo de 7 a 15 días durante todo el ciclo reproductivo.
Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Calabacita		
Fresa, Frambuesa, Zarzamora, Arándanos, Kiwi, Vid		
Cítricos	FOLIAR 200 - 300 g	Aplicar a inicios de floración y repetir 15 días después
Aguacate	FOLIAR 250 - 500 g	Aplicar a inicios de floración y repetir 30 días después
Papaya	FOLIAR 100 - 200 g	Aplicar a inicios de floración y repetir 30 días después

## Compatibilidad

**FIORENTEX VP®** se puede mezclar con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previo a la aplicación.

