



HORMAX VP®

BIOREGULADOR CELULAR


Estimulante de alta especialidad, diseñado con un balance preciso de componentes para favorecer el desarrollo óptimo del área foliar y la estructuración vegetativa de la planta.



Composición garantizada % p/p

KINETINA	11,000 ppm
AUXINAS	11,000 ppm
GIBERELINA	3,000 ppm
ÁCIDO INDOL ACÉTICO (AIA)	11,000 ppm
NITRÓGENO (N)	10.00
FÓSFORO (P2O5)	12.00
POTASIO (K2O)	12.00
ÁCIDOS POLICARBOCÍLICOS	5.00
ALGAS MARINAS (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	3.00
VITAMINAS	2.00
EXTRACTOS ORGÁNICOS	53.50

Presentación: 500 g y 5 kg



HORMAX VP®



Descripción del producto

HORMAX VP® es un estimulante con una composición compleja, balanceada y funcional, ideal para complementar aquello que la planta no puede sintetizar durante períodos de estrés.

El balance hormonal de **HORMAX VP®** lo convierte en una herramienta ideal durante el desarrollo del área foliar y en la última etapa de llenado de fruto.

HORMAX VP® esta complementado con un aporte energético y mineral para poder realizar las actividades metabólicas durante períodos críticos de estrés biótico y abiótico.

HORMAX VP® optimiza la síntesis de proteínas y enzimas promotoras del crecimiento y de la división celular, algunos otros beneficios son:

- Potencializa los procesos de desarrollo vegetativo.
- Restablece la fisiología normal de tu cultivo.
- Fortalece tu cultivo desde las primeras etapas.
- Favorece un desarrollo armónico del cultivo.
- Mejora la adaptación del cultivo a condiciones extremas.

Recomendaciones de uso

HORMAX VP® se recomienda aplicar vía foliar y al suelo; sus efectos son especialmente notables en las primeras etapas de los cultivos, favoreciendo principalmente la estructuración y manejo del área foliar de los cultivos.

HORMAX VP® se recomienda aplicar cada 15 días durante la etapa fenólica recomendada.

CULTIVOS	DOSIS/ha	ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
Ajo, cebolla, rábano, Zanahoria		Realizar de una a dos aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo con intervalos de 7 a 14 días.
Col, Col de Bruselas, Brócoli		
Espinaca, Lechuga, Perejil, Apio	FOLIAR 150 - 250 g	
Avena, Trigo, Centeno, Cebada	SUELO 1 a 2 kg	
Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate de cáscara		Realizar de dos a tres aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo con intervalo de 7 días. Realizar una aplicación para crecimiento de fruta cuando la planta este en situación de estrés biótico o abiótico.
Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Calabacita		
Fresa, Frambuesa, Zarzamora, Arándanos, Kiwi, Vid		En fresa realizar dos aplicaciones en formación de coronas con intervalo de 15 días; el resto de los cultivos realizar una aplicación al desarrollo vegetativo y otra para formación de cargadores.
Caña de azúcar		
Cítricos		Aplicar la dosis baja a los 45 - 60 días de la siembra y la dosis alta a los 45 días después de la primera.
Maíz, Sorgo		Realizar de 2 a 3 aplicaciones para manejo del área foliar, se puede realizar aplicación para crecimiento de fruta cuando la planta este en situación de estrés.
Aguacate	FOLIAR 250 - 500 g	Realizar de una a dos aplicaciones para promover formación de brote vegetativo, para manejo de área foliar.
Papa	FOLIAR 150 - 250 g	Aplicar dosis baja al momento de la siembra, bañando los tubérculos y repetir con dosis alta al inicio de la tuberización.
Papaya	FOLIAR 150 - 250 g	Realizar de una a dos aplicaciones para manejo de área foliar.

Compatibilidad

HORMAX VP® se puede mezclar con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previo a la aplicación.



TU EXPERTO EN BIOESTIMULACIÓN



VP ESTIMULANTES